

Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu, 16 pastylek twardych



Cena: 13,63 zł

Opis słownikowy

Dawka	3mg+1mg
Opakowanie	16 pastylek twardych
Postać	pastylki twarde
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydamine hydrochloridum, Cetylpirydini chloridum
Wiek	od 6 roku życia



- Przeciwbólowa
- Przeciwzapalna
- Antyseptyczna

Opis produktu

Wskazania

Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i antyseptyczny w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł i zapaleniu gardła.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyseptyczne do stosowania miejscowego w jamie ustnej. Pastylki odkażają jamę ustną i gardło oraz zmniejszają objawy zapalenia gardła, takie jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie oraz zaburzenie funkcjonowania.

Dawkowanie

- Dorośli: 3 do 4 pastylek twardych na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 do 4 pastylek twardych na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 3 pastylki twarde na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować leku przed lub w trakcie posiłku lub picia. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu leku. Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed lub po umyciu zębów.
- Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie zmniejszą się po 3 dniach, lub wystąpią inne objawy, takie jak gorączka, należy skonsultować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza, w przypadku nawrotu leczonej choroby lub zmian w jej przebiegu.

Skład

Każda pastylka twarda zawiera 3 mg chlorowodoru benzydaminowy i 1 mg chlorku cetylpirydyniowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: izomalt (E 953): 2448,3 mg na pastylkę twardą, butylohydroksyanizol (E 320): 0,0004 mg na pastylkę twardą, benzoosan sodu (E 211): do 0,00075 mg na pastylkę twardą.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na chlorowoderek benzydamin, chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

- Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pokrzywka, zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne (nadwrażliwość na światło); nagłe, niekontrolowane zwężenie dróg oddechowych w płucach (skurcz oskrzeli).
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): miejscowe podrażnienie jamy ustnej, uczucie pieczenia w jamie ustnej.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcja alergiczna (nadwrażliwość): ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, oraz która może potencjalnie zagrażać życiu; uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, utrata czucia (znieczulenie) błony śluzowej jamy ustnej.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

▶ Ból gardła to **najczęstszy** objaw infekcji¹




▶ Nawet do **95% przypadków** zapalenia gardła spowodowanych jest przez **Wirusy**




1. Scott S. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. *Lancet Infect Dis.* 2005; 5(11):780-20. 2. Ashby C, Shephard A. Incidence, causes, severity and treatment of throat discomfort: a meta-analysis of the epidemiology survey. *BMC Clin Res Ther* 2012; 12(1):1-14.



Septolete[®] ultra o potrójnej sile działania

-  Chlorek cetylopirydyniowy **ELIMINUJE PRZYCZYNY INFEKcji** (wirusy i bakterie)
-  Benzydamina **ZMNIJSZA STAN ZAPALNY**
-  Benzydamina **SZYBKO ŁAGODZI BÓL**

Charakterystyka Produktu Leczniczego Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu 3 mg + 1 mg, parafarmaceuta c/o KRIO 11.2022.



Działa **SZYBKO** i **DLUGO**^{*1}



6+
BEZ CUKRU
BEZ GLUTENU

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ:



* Na podstawie badań klinicznych.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu 3 mg + 1 mg, parafarmaceuta c/o KRIO 11.2022.



