

Sinecod 1,5 mg/ml, 100 ml



Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Butamiratum
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

Działanie

Lek przeciwkaszlowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dawkowanie

Lek należy stosować doustnie.

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę;
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę;
- Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Sinecod dłużej niż 5-7 dni.

Skład

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu oraz substancje pomocnicze: sorbitol 70% roztwór, sacharynę sodową, wanilinę, kwas benzoesowy, etanol 96%, glicerol, sodu wodorotlenek 30% roztwór, wodę oczyszczoną.

Przechowywanie

W temperaturze do 30°C.

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) występują następujące objawy: senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Wymienione objawy powinny ustąpić po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.