


Sinulan Rinse, zestaw do płukania nosa i zatok, Irygator + 12 saszetek



Cena: 24,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	Irygator + 12 saszetek
Producent	STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Sinulan Rinse, zestaw do płukania nosa i zatok, przeznaczony dla dzieci powyżej 4. roku życia i dorosłych. Wyrób medyczny zawierający rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu przeznaczonego do płukania nosa i zatok. Pudełko zawiera irygator oraz 12 saszetek. Stosowany jest w prewencji i objawowym leczeniu zapalenia zatok i nieżytów nosa. Oczyszcza i udrażnia nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny i zalegającego śluzu.

Zastosowanie

W prewencji i objawowym leczeniu zapalenia zatok i nieżytów nosa w przypadku: zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, katarze o różnym podłożu, w higienie nosa.

Sposób użycia

Dzieci powyżej 4 roku życia i osoby dorosłe:

- Płukanie nosa przeprowadzić 1-3 razy dziennie chyba, że lekarz zaleci inaczej. Profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu. Godzinę po płukaniu nie wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19oC. Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Przed przystąpieniem do płukania sprawdzić należy temperaturę wody.

Skład

Chlorek sodu.

Przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25oC.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki wyrobu.
- Nie stosować w przypadku otwartych, niegojących się ran w nosie, szczególnie po operacjach.
- Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha.
- Nie stosować w przypadku problemów z równowagą lub w sytuacji występowania poważnego krwawienia z nosa.
- Osoby po operacjach laryngologicznych, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli itp.) przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.