


Sinupret extract 160 mg, 20 tabletek drażowanych



Cena: 43,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,16 g
Opakowanie	20 tabletek drażowanych
Postać	tabletki drażowane
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Leczenie ostрых niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych) u dorosłych.

Działanie

Leczenie ostрых niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych) u dorosłych.

Dawkowanie

- Dorośli: 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę (maksymalnie do 3 tabletek drażowanych na dobę). Brak wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek/wątroby,
- Tabletki drażowane należy połykać bez rozgryzania i żucia, popijając go pewną ilością płynu, np. szklanką wody,
- Jeśli nie zostało określone inaczej, lek należy przyjmować przez okres 7-14 dni.

Skład

1 tabletkę drażowaną zawiera:

160 mg suchego wyciągu (DER pierwotny 3-6:1) złożonego z korzenia goryczki (*Gentiana lutea*L.), kwiatu pierwiosnka (*Primula veris*L.), ziela szczawiu (*Rumex crispus*L.), kwiatu bzu czarnego (*Sambucus nigra*L.), ziela werbeny (*Verbena officinalis*L.) (1:3:3:3); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 51% (m/m). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza - 3,141 mg, sacharoza - 133,736 mg.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Choroba wrzodowa,
- Rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub

niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Działania niepożądane

Często: zaburzenia przewodzenia pokarmowego, np. wzdęcia, nudności, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha.

Niezbyt często: miejscowe reakcje nadwrażliwości (rumień, osutka, świąd skóry lub oczu);układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, duszność, obrzęk twarzy);zawroty głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeżeli u pacjenta występuje krwotok z nosa, gorączka, silny ból, ropna wydzielina z nosa, zaburzenia widzenia, asymetria twarzy lub oczu lub drętwienie twarzy, wymagana jest diagnostyka różnicowa i leczenie,
- Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7-14 dni, pogarszają się lub okresowo nawracają należy zalecić pacjentowi skonsultowanie się z lekarzem,
- W przypadku znanego zapalenia żołądka i u pacjentów z wrażliwym żołądkiem należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania tego leku,
- Informacja dla diabetyków: jedna tabletkę drażowaną zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.
- Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.