

Skinoren, krem, 30 g



Cena: 55,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	200 mg
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	LEO PHARMA A/S
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum azelaicum

Opis produktu

Wskazania

Trądzik pospolity i przebarwienia skóry. Do stosowania dla dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 18. lat i osób dorosłych.

Działanie

Leczy trądzik pospolity oraz przebarwienia skóry.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy, glikol propylenowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Dawkowanie

Lek Skinoren należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosować wyłącznie na skórę.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.

O ile lekarz nie zaleci inaczej: cienką warstwę kremu należy nanosić na chorobowo zmienioną skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Krem należy delikatnie wetrzeć. Pasek wyciśniętego z tubki kremu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na skórę twarzy. Po nałożeniu leku należy umyć ręce.

Skład

Substancją czynną leku jest kwasu azelainowy 200 mg/g.

Pozostałe składniki: kwas benzoesowy, estry polietylenowe kwasów tłuszczowych, mieszanina mono-, di- i trójglicerydów wyższych kwasów tłuszczowych, oktanonian cetearylu, glikol propylenowy, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 30°C.

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Skinoren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia może wystąpić podrażnienie skóry.

- Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): świąd, uczucie pieczenia, rumień w miejscu podania.
- Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): łuszczenie skóry, ból, suchość, odbarwienie skóry, podrażnienie w miejscu podania.
- Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): zapalenie łojotokowe skóry, trądzik, odbarwienie skóry, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia), zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, obrzęk w miejscu podania.
- Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): zapalenie warg, pęcherze, wyprysk, uczucie ciepła, owrzodzenie w miejscu podania, reakcja alergiczna (nadwrażliwość), pogorszenie objawów astmy.