

# Skinoren Rosacea 150 mg/ g, żel, 30 g



Cena: 61,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	150 mg/ g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	LEO PHARMA A/S
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum azelaicum

## Opis produktu

### Wskazania

Do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego.

### Działanie

Przeciwtrądzikowe.

### Dawkowanie

Nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wcierać w skórę. Około 2,5 cm leku wyciśniętego z tuby, co odpowiada 0,5 g żelu, wystarcza na pokrycie całej twarzy.

### Skład

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.

1 g leku Skinoren Rosacea zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbát 80, lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer 980, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy (E210) i woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

### Działania niepożądane

- Może wystąpić podrażnienie skóry (np. pieczenie i swędzenie). W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne lub umiarkowane. Częstość ich występowania zmniejsza się w miarę długości leczenia.
- Najczęściej obserwowane działania niepożądane to swędzenie (świąd), pieczenie i ból w miejscu podania.
- Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): pieczenie, ból, swędzenie (świąd) w miejscu podania;
- Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), suchość skóry, wysypka,

- opuchnięcie (obrzęk) w miejscu podania;
- Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): trądzik, reakcja skórna na czynnik zewnętrzny (kontaktowe zapalenie skóry), nienaturalne zaczerwienienie twarzy (rumień), pokrzywka, uczucie dyskomfortu w miejscu podania;
- Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób): reakcja alergiczna (nadwrażliwość), pogorszenie objawów astmy.

Zazwyczaj, miejscowe podrażnienie skóry ustępuje w trakcie leczenia.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku obserwowano zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano ich u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego, chociaż nie można tego wykluczyć (częstość występowania nie jest znana).

#### **Przechowywanie**

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
- Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu leku z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi.
- Po każdym nałożeniu leku należy umyć ręce.
- Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia lekiem wskazane jest powstrzymanie się od używania innych leków do stosowania miejscowego, a także produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydło, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz złuszczone. Rzadko obserwowano przypadki pogorszenia objawów astmy u pacjentów z astmą oskrzelową leczonych kwasem azelainowym.
- W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.