

# Skinsept Pur, roztwór, 1000 ml



Cena: 53,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1000 ml
Postać	roztwór
Producent	ECOLAB SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony

## Opis produktu

### Wskazania

Odkazanie skóry przed operacjami, iniekcjami, szczepieniami, punkcjami, pobraniem krwi, lub zmianami opatrunku.

### Działanie

Odkazające i odtłuszczające skórę.

### Dawkowanie

- Stosować zewnętrznie, miejscowo na skórę, nie rozcieńczać.

Odkazanie skóry przed operacjami i punkcjami: nierozcieńczony lek nanieść przy pomocy sterylnej tampony na skórę, rozprowadzić po powierzchni skóry, odczekać 1 minutę aż do wyschnięcia. Przy zagrożeniu wirusem HBV czynność odkazania należy powtórzyć oraz przedłużyć czas działania do 2 minut.

Odkazanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, zmianą opatrunku: partię skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy przedłużyć czas działania do 1 minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut powtórnie spryskując skórę.

### Skład

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego.

Pozostałe składniki: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Lek nie może być stosowany do dezynfekcji otwartych ran o dużej powierzchni.
- Lek nie może być stosowany do dezynfekcji błon śluzowych.

- Nie stosować u noworodków urodzonych przedwcześnie.
- Nie stosować w okolicy oczu.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP).
- Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
- Nie należy stosować do odkażania kikuta pępowiny u noworodków.
- Ostrożnie stosować u noworodków urodzonych o czasie i jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na procedurę odkażania.
- Stosować ostrożnie na powierzchni wrażliwe na działanie alkoholu.
- Unikać kontaktu z oczami.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.