

# Smecta 3g, 10 saszetek



Cena: 9,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	3 g
Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Producent	IPSEN POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diosmectite

## Opis produktu

### Wskazania

Lek stosuje się:

- w leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci,
- w leczeniu przewlekłej biegunki u dorosłych.

### Działanie

Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Lek zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące. W wyniku tego działania i dzięki zdolności wiązania innych substancji, lek ochrania błonę śluzową przewodu pokarmowego.

### Dawkowanie

- Dorośli: zwykle podaje się 3 saszetki na dobę. Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową. Zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Zaleca się podawanie leku między posiłkami.
- Dzieci: dawkowanie leku u dzieci powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem. Dzieci poniżej 1 roku: 1 saszetka na dobę; w wieku od 1 do 2 lat: 1 do 2 saszetek na dobę, w wieku powyżej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dobę. Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia. Można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: np. bulionem,

przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2-3 dni, oraz w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

### Skład

Substancją czynną leku jest: diosmektyt (glinokrzemian). Jedna saszetka zawiera 3 g diosmektytu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

**Przeciwwskazania**

Uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Działania niepożądane**

- W przypadku zauważenia, któregośkolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza: reakcji alergicznej (nadwrażliwości) – objawy mogą obejmować wysypkę skórą, świąd, pokrzywkę; ciężkiej reakcji alergicznej powodującej obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy).
- Pozostałe działania niepożądane obejmują: występujące często (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów): zaparcia.

**Przechowywanie**

W suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Objętość podawanych roztworów i ich drogę podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunki.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia.
- Ze względu na swoje właściwości, lek może mieć niekorzystny wpływ na szybkość i (lub) stopień wchłaniania innych leków.
- Nie zaleca się podawania żadnych innych leków w połączeniu z lekiem Smecta.
- Inne leki można podawać 2 godziny przed podaniem lub 2 godziny po podaniu leku Smecta.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania tego leku u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy lub niedoborem sacharazy/izomaltazy.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.