

SOFARGEN Gel żel na rany, oparzenia i odleżyny, 25 g



Cena: 33,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	25 g
Postać	żel
Producent	AVEC PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

SOFARGEN Gel żel na rany i oparzenia niewielkich rozmiarów, to opatrunek na bazie żelu z sulfadiazyną srebra. Stosowany jest zewnętrznie. Składniki żelu tworzą odpowiednie warunki do gojenia się ran oraz skutecznie chronią przed drobnoustrojami. SOFARGEN Gel zawiera ponad 95% wody, zapewniając nawilżenie rany i pomagają w odbudowie tkanki. Srebro tworzy barierę chroniącą uszkodzoną skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Sulfadiazyna srebra zapobiega zanieczyszczeniom mikrobiologicznym opatrunku i chroni ranę przed bakteriami egzogennymi.

Zastosowanie

SOFARGEN Gel żel na rany i odleżyny, zalecany jest do stosowania miejscowego na rany i oparzenia niewielkich rozmiarów (otarcia, zadrapania, skaleczenia, rany, podrażnienia skóry, inne problemy dermatologiczne). Można stosować w celu utrzymania właściwej wilgotności rany i zapobiegając infekcjom oraz środek oczyszczający w celu usunięcia tkanki martwiczej i skrzepów.

Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę i nanieść równomiernie warstwę 2-3 mm żelu na zmienioną powierzchnię skóry. Żel można zastosować bezpośrednio na skórę lub nałożyć na jałową gazę, która następnie przyłożyc na skórę.
- Stosowanie SOFARGEN Gel powinno być systematyczne i bez przerw, 1 lub 2 razy dziennie do całkowitego wyleczenia.
- Przed ponownym założeniem żelu, każdorazowo należy oczyścić ranę przemywając roztworem soli fizjologicznej lub wodą.

Skład

Woda oczyszczona, Glicerol, Carbopol 974P, Wodorotlenek sodu, Mikronizowana sulfadiazyna srebra.

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek składnik.
- Nie zaleca się stosowania dłużej niż 4 tygodnie.
- Z powodu zawartości jonów srebra żel może przebarwiać się na brązowo pod wpływem światła. Zjawisko to nie ma wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu.

- Nie stosować jednocześnie z innymi płynami lub środkami dezynfekującymi.
- Kobiety w ciąży i stosowanie u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
- Stosować do leczenia niewielkich ran.
- Nie stosować do oczu.