

# Soledum forte 200 mg, 20 kapsułek dojelitowych miękkich



Cena: 27,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	20 kapsułek dojelitowych miękkich
Postać	kapsułki dojelitowe miękkie
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cineolum

## Opis produktu

### Wskazania

Środek wykrztuśny w leczeniu produktywnego kaszlu (zwanego inaczej mokrym kaszlem) oraz w leczeniu wspomagającym ostrego, nieropnego zapalenia zatok.

### Działanie

Przeciwkaszlowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka jednorazowa: 1 kapsułka (co odpowiada 200 mg cyneolu), całkowita dawka dobową: 2 - 3 kapsułki (co odpowiada

400 – 600 mg cyneolu).

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.
- W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu dawka 1 kapsułka 2 razy na dobę jest zazwyczaj wystarczająca.
- Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do charakteru, nasilenia i rozwoju choroby. Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień), chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub krwawe albo ropne odkrztuszenie.
- Lek należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając wystarczającą ilością wody (najlepiej szklanka wody 200 ml), co najmniej pół godziny przed posiłkiem.

W przypadku wrażliwego układu pokarmowego, kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłków.

### Skład

Substancją czynną leku jest cyneol (Cineolum).

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu.

Pozostałe składniki to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekryształujący, glicerol

85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease - Nutramer (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutramer (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk Candelilla.

Jedna kapsułka leku Soledum forte jest równoważna 0,0015 jednostkom chlebowym.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- W przypadku krztuśca lub pseudo-krztuśca;
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### Działania niepożądane

- Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów): zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka)
- Rzadko (od 1 do 10 na 10000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności w połykaniu.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30 °C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropne albo krwawe odksztuszanie, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Lek Soledum forte a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W badaniach na zwierzętach wykazano, że cyneol indukuje metabolizm enzymów w wątrobie. Nie można więc wykluczyć, że duże dawki cyneolu mogą osłabiać lub skracać działanie innych leków. Jak do tej pory nie stwierdzono takiego działania u człowieka.
- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku Soledum forte w czasie ciąży. W przypadku ciąży lek ten można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że u szczurów cyneol – substancja czynna leku Soledum forte – przenika barierę łożyska do krwiobiegu płodu. Jednak dotychczasowe wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na występowanie jakichkolwiek wad u płodu.

Karmienie piersią: 1,8-cyneol przenika do mleka matki po podaniu doustnym, ale dotychczas nie zgłaszano zauważalnych problemów u niemowląt karmionych piersią matek przyjmujących 1,8-cyneol.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: nie ma konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności.
- Lek Soledum forte w jednej kapsułce zawiera 17 mg sorbitolu.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.