

Solphadermol 5%, płyn, 2 ml



Cena: 40,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	2 ml
Postać	płyn
Producent	SOLPHARM SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Solphadermol, to roztwór do usuwania zmian skórnych mięczaka zakaźnego. Wodorotlenek potasu (KOH) niszczy otoczki tworzone wewnątrzkomórkowo przez wirusy MZ. Dzięki temu wirusy stają się rozpoznawalne dla układu immunologicznego i organizm uruchamia procesy obronne. Pojawia się miejscowy stan zapalny wówczas należy przerwać stosowanie roztworu, wraz z ustępowaniem reakcji zapalnej znikają wykwity mięczaka.

Zastosowanie

Usuwanie zmian skórnych mięczaka zakaźnego.

Sposób użycia

- 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.
- Dotknąć guzków mięczaka płaską częścią szpatułki i zostawić roztwór do wyschnięcia.
- Po nałożeniu preparatu na 1-3 guzki należy ponownie zanurzyć w preparacie. Jeśli na guzku mięczaka nie jest widoczna kropelka (wielkości ziarnka piasku), należy ponownie zwilżyć szpatułkę i dotknąć nią guzka.
- Należy zaprzestać stosowania preparatu w momencie pojawienia się stanu zapalnego wskazującego na proces gojenia. Zapalenie objawia się w postaci zaczerwienienia, które utrzymuje się przynajmniej 12 godzin. Należy zaprzestać stosowania preparatu nie później niż po 14 dniach, nawet jeśli zapalenie nie pojawi się.
- Umyć ręce po każdym użyciu.

Skład

5-procentowy wodorotlenek potasu, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Solphadermol:

- w pobliżu oczu,
- na guzkach, na których występuje już zapalenie,
- na błony śluzowe (w ustach oraz na genitaliach),
- na otwarte rany, zadrapaną lub uszkodzoną skórę,
- do eliminacji brodawek zwykłych, brodawek starczych, znamion, odcisków lub innych zrogowaceń,
- u niemowląt i dzieci poniżej 2 lat,
- w przypadku tendencji do tworzenia się nadmiaru tkanki bliznowatej (blizn hipertroficznyc lub keloidów),

- u osób z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem działania układu immunologicznego (HIV lub leczonych z użyciem leków tłumiących działanie układu immunologicznego) ze względu na niewystarczające dane w tym zakresie,
- u kobiet karmiących piersią unikać kontaktu dziecka z miejscami stosowania preparatu,
- w ostrych stanach atopowego zapalenia skóry, a jedynie po uprzednim leczeniu przez lekarza.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.