

## Somilux krople do oczu, 10 ml



Cena: 51,00 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Somilux krople do oczu, to wyrób medyczny do oczu w postaci roztworu z liposomalną laktoferyną o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, nawilżających i chelatujących jony żelaza. Dzięki zdolności laktoferyny do wiązania jonów żelaza wykazuje ona właściwości przeciwzapalne oraz hamujące wzrost mikroorganizmów. Schorzenia narządu wzroku jak zapalenie powiek i spojówek, a także choroby układowe, zabiegi operacyjne, podeszły wiek, czynniki środowiskowe (drobny pył, smog, alergeny) czy czynniki nadwyrężające narząd wzroku (długotrwała praca przy komputerze, soczewki kontaktowe, nadmierna ekspozycja na wiatr i słońce) mogą wpływać na znaczne zmniejszenie ilości laktoferyny w filmie łzowym, a zatem zwiększać ryzyko infekcji i stanów zapalnych oczu.

#### Zastosowanie

- Ochrona oka w przypadku ryzyka wystąpienia przed- i pooperacyjnych zanieczyszczeń mikroorganizmami.
- Wspomaganie leczenia krwotoku podspojówkowego, przekrwienia oka i zespołu suchego oka wywołanych przez stany zapalne i dysfunkcje gruczołów łzowych.

#### Sposób użycia

- Aby otworzyć butelkę należy pociągnąć za pierścień zabezpieczający.
- Zdjąć nasadkę pociągając do góry.
- Odchylić lekko głowę do tyłu, delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół i spojrzeć w górę.
- Przekręcić butelkę do góry dnem i delikatnie przyciskając zakropić 1-2 krople do każdego oka.
- Zamknąć butelkę.

#### Skład

Woda, laktoferyna liposomalna, gliceryna, hialuronian sodu, witamina E, EDTA, bufor TRIS.

#### Przechowywanie

- Opakowanie szczelnie zamknięte, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła.
- Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Przedłużone stosowanie może dawać objawy uczuleniowe.