

Sora Forte, szampon leczniczy, 50 ml



Cena: 22,49 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Dawka	0,01 g/ml
Opakowanie	50 ml
Postać	szampon leczniczy
Producent	SCAN-ANIDA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Permethrinum
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis

Sora Forte, szampon leczniczy, przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. Lek stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej, w celu usunięcia pasożytów oraz profilaktycznie u osób, które mają bezpośredni kontakt z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Wskazania

Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Działanie

Szampon leczniczy na wszawicę.

Dawkowanie

- Stosować wyłącznie na włosy głowy.
- Do opakowania dołączony jest grzebień higieniczny, ułatwiający wyczesywanie martwych wszy i jaj (gnid).

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:

- Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć tubą.
- Na zwilżone włosy głowy należy nałożyć odpowiednią ilość szamponu w stosunku do długości i gęstości włosów, tak aby dokładnie nasycić włosy i skórę głowy.
- Następnie równomiernie rozprowadzić szampon, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Przyjmuje się że objętość 50 ml jest wystarczająca do umycia włosów średniej długości (włosy do ramion). Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte

szamponem. Uzyskaną pianę należy pozostawić na włosach przez 10 minut, a następnie spłukać włosy i starannie wyczesać grzebieniem dołączonym do opakowania, w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid).

- Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Zabieg można powtórzyć wcześniej, w przypadku stwierdzenia obecności wszy i gnid.

Skład

1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betainę kokamidopropylową, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanoamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycję zapachową, wodę oczyszczoną

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnej, szczelnie zamkniętej tubie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
- Kobiety w ciąży i okresie karmienia piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.