

Sora Med Zestaw do zwalczania wszawicy, preparat do zwalczania wszawicy + Szampon leczniczy, 100 ml + 100 ml



Cena: 34,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml + 100 ml
Postać	płyn, szampon
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Sora med. preparat do zwalczania wszawicy

To wyrób medyczny do zwalczania wszawicy głowowej w przypadku zasiedlenia skóry głowy i włosów przez wszy ludzkie (*Pediculus humanus*).

Zawarty w wyrobie dimetykon (olej silikonowy) powleka wszy oraz ich jaja/ gnidy okluzyjną warstwą, uniemożliwiając wymianę gazową. Prowadzi to do zablokowania procesu oddychania i wydalania wody przez wszy i ich larwy oraz zaburzenia wzrostu i dojrzewania gnid, w wyniku czego obumierają a cykl życiowy pasożyta zostaje przerwany. Dodatkowo wytworzona na powierzchni włosów warstwa przeciwdziała przytwierdzeniu gnid i ułatwia ich wyczesanie.

Wyrób nie zawiera barwników, środków zapachowych ani konserwujących.

Sora med wykazuje potrójne działanie:

- zaburza proces oddychania wszy i gnid,
- niszczy wszy i larwy, blokując wydalanie przez nie wody,
- zmniejsza przyczepność gnid do włosów.

Sora Forte. szampon leczniczy

szampon leczniczy, przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. Lek stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej, w celu usunięcia pasożytów oraz profilaktycznie u osób, które mają bezpośredni kontakt z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Zastosowanie

Sora med. preparat do zwalczania wszawicy

Do zwalczania wszawicy głowowej w przypadku zasiedlenia skóry głowy i włosów przez wszy ludzkie (*Pediculus humanus*). Dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.

Sora Forte. szampon leczniczy

Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Sposób użycia

Sora med. preparat do zwalczania wszawicy

- Przed zastosowaniem należy osłonić ramiona, np. ręcznikiem.
- Wyrób należy nałożyć na suche włosy, dokładnie wmasować aż do całkowitego zwilżenia włosów i skóry głowy.
- Pozostawić na włosach co najmniej 10 minut.
- Wyczesać dokładnie włosy za pomocą dołączonego grzebienia, w celu usunięcia wszy i gnid. W trakcie wyczesywania należy oczyszczać grzebień za pomocą chusteczki.

Po wyczesaniu włosów należy dokładnie włosy załóżonym w zestawie szamponem.

Sora Forte. szampon leczniczy

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:

- Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć tubą.
- Na zwilżone włosy głowy należy nałożyć odpowiednią ilość szamponu w stosunku do długości i gęstości włosów, tak aby dokładnie nasycić włosy i skórę głowy.
- Następnie równomiernie rozprowadzić szampon, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Przyjmuje się że objętość 50 ml jest wystarczająca do umycia włosów średniej długości (włosy do ramion). Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepki na włosy pokryte szamponem. Uzyskaną pianę należy pozostawić na włosach przez 10 minut, a następnie spłukać włosy i starannie wyczesać grzebieniem dołączonym do opakowania, w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid).
- Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Zabieg można powtórzyć wcześniej, w przypadku stwierdzenia obecności wszy i gnid.

Składniki

Sora med. preparat do zwalczania wszawicy

Dimetykon (olej silikonowy) 100%.

Sora Forte. szampon leczniczy

1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betainę kokamidopropylową, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanolamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycję zapachową, wodę oczyszczoną.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

