

# Soyfem 100 mg, 60 tabletek powlekanych



Cena: 44,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Glycine semen extractum siccum

## Opis produktu

### Wskazania

Do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia takich objawów jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

### Działanie

Lek zmniejsza nasilenie dolegliwości występujących w tym okresie, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

### Dawkowanie

- Zalecana dawka to 1 - 2 tabletki dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
- Lek przyjmuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.
- Linia podziału na tabletkę tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.
- Nie należy przekraczać 2 lat stosowania leku.

### Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg z nasion soi.

Każda tabletkę powlekana zawiera 100 mg wyciągu suchego z Glycine max L., semen (Glycine max semen extractum siccum) (100 – 400 : 1), co odpowiada 26 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę.

Rozpuszczalnik używany do ekstrakcji: etanol 60% – 70% V/V.

- Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, powidon, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, talk, glicerol.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Okres ciąży,
- Okres karmienia piersią.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała nowotwór (raka) piersi,
- jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występował nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (przerost endometrium).
- Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.
- Podczas stosowania leków zawierających wyciąg z soi nie zaobserwowano interakcji z innymi stosowanymi równocześnie lekami.
- Lek najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.
- W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.