

# Soyfem Forte 230,8 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 52,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,2308 g
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Glycine semen extractum siccum

## Opis produktu

### Wskazania

U kobiet w okresie przekwitania w celu: łagodzenia takich objawów jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

### Działanie

Przyjmowanie leku przez kobiety w okresie przekwitania zmniejsza nasilenie dolegliwości występujących w tym okresie, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

### Dawkowanie

- Zalecana dawka to 1 - 2 tabletki raz na dobę. Lek przyjmuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.
- Linia podziału na tabletkach tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.
- Nie należy przekraczać 2 lat stosowania leku.

### Skład

- Substancją czynną leku jest wyciąg z nasion soi.

Każda tabletki powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu suchego z Glycine max L., semen (Glycine max semen extractum siccum), (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę.

Rozpuszczalnik używany do ekstrakcji: etanol 60% – 70% V/V.

- Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, karmeloza sodowa, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Okres ciąży,

- Okres karmienia piersią.

#### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała nowotwór (raka) piersi,
- jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występował nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (przerost endometrium).
- Dzieci i młodzież: lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.
- Ten lek a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować. Podczas stosowania leków zawierających wyciąg z soi nie zaobserwowano interakcji z innymi stosowanymi równocześnie lekami.
- Lek ten z jedzeniem i pić: lek najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.
- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.