

Spastyna Max 80 mg, 20 tabletek



Cena: 10,47 zł

Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum

Opis produktu

Wskazania

- W stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera;
- W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz;

Wspomagająco:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Działanie

Rozkurczające.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: dawka dobową wynosi 120-240 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).
- W przypadku konieczności zastosowania leku dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobową wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową drotaweryny w tej grupie wiekowej wynosi 160 mg.
- Nie stosować leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek drotaweryny. 1 tabletkę zawiera 80 mg chlorowodoru drotaweryny.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, powidon K 30, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,
- Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia,
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): nudności, zaparcie, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować leku w czasie porodu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.