

Starazolin Alergia, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 5 ml



Cena: 31,24 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	5 ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Olopatadinum

Opis produktu

Wskazania

Leczenie objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Lek może być stosowany tylko u osób dorosłych.

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.
- Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.
- Dorośli: 1 kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem dawek.
- W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Czas leczenia wynosi do 2 tygodni. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do 4 miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.

Skład

Substancją czynną leku jest olopatadyna (w postaci olopatadyny chlorowodoru). Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodoru).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbit 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): Działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka. Objawy ogólne: bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.
- Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów): Działania dotyczące oka: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka. Objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe), uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek. Objawy ogólne: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności,

wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.

- U pacjentów ze znacznie uszkodzoną przednią, przezroczystą warstwą oka (rogówką), bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na rogówce spowodowane przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 90 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.