

Starazolin Free 0,5 mg/ml, krople do oczu, 10 ml



Cena: 23,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu

Wskazania

Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub reakcją alergiczną (np. katar sienny).

Działanie

Skurcz naczyń włosowatych (zwięzienie naczyń), utrzymującego się przez 4 do 8h.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kropla do każdego podrażnionego oka 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 2 do 1 lat: po konsultacji z lekarzem.

Skład

1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodoru. Krople do oczu, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór (pH 6,2 - 6,5; osmolalność 0,265 - 0,306 osmol/kg).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną;
- Jaskra z wąskim kątem przesączania;
- Ciężka choroba układu krążenia (np. choroba tętnic wieńcowych serca lub nadciśnienie tętnicze);
- Guz chromochłonny nadnerczy;
- Rozrost gruczołu krokowego;
- Zaburzenia przemiany materii (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, porfiria);
- Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze;
- Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

: Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nasilony obrzęk błony śluzowej oka (przekrwienie reaktywne), pieczenie lub suchość błony śluzowej oka, kołatanie serca, ból głowy, drżenie, osłabienie, potliwość, podwyższone ciśnienie tętnicze, szybkie tętno.

- Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): rozszerzenie źrenic.
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): keratynizacja (rogowacenie) powierzchni spojówki, prowadząca do zamknięcia kanalików łzowych i łzawienia spowodowanego zaburzeniami w odpływie łez po przedłużającym się stosowaniu tego leku.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): szczypanie w oku lub jego okolicy, zaczerwienienie, obrzęk, ból, swędzenie, niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30oC.
- Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 28 dni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.