

Starazolin, suche i podrażnione oczy, krople do oczu, 10 ml



Cena: 30,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Krople do oczu Starazolin, suche i podrażnione oczy są przeznaczone do stosowania w celu zmniejszenia nasilenia objawów w łagodnej do umiarkowanej postaci zespołu suchego oka i/lub podrażnieniu powierzchni oka. Krople stabilizują film łzowy, nawilżają oko i odbudowują jego powierzchnię.

Krople działają podwójnie: zawierają hialuronian sodu, który nawilża i stabilizuje film łzowy oraz dekspantenol, który łagodzi, chroni i ułatwia regenerację powierzchni oka.

Łagodzenie objawów zespołu suchego oka może zapobiec powikłaniom. Najczęstsze objawy zespołu suchego oka: odczuwanie suchości, uczucie piasku pod powiekami i podrażnienia. Krople można stosować na soczewki kontaktowe.

Zastosowanie

Na różne objawy oczu spowodowane zespołem suchego oka lub podrażnieniem.

Sposób użycia

- W razie potrzeby krople można stosować kilka razy na dobę.
- Zakropić 1–2 krople do oczu, kilkakrotnie mrugnąć, aby roztwór uległ równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni oka.

Skład

Clorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, woda oczyszczona.

Przechowywanie

- W temperaturze do 25 w oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po otwarciu zużyć w ciągu 180 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na hialuronian sodu, dekspantenol lub jakikolwiek inny składnik produktu.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.
- Każda butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę dla celów bezpieczeństwa i higieny.
- W przypadku zastosowania innego produktu do oczu należy odczekać 15 minut pomiędzy aplikacjami.
- Bezpośrednio po podaniu kropli może dojść do osłabienia ostrości widzenia. W związku z tym zaleca się, aby w tym krótkim okresie powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i poczekać do odzyskania ostrości widzenia.