

Stodal syrop, 200 ml



Cena: 22,45 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	BOIRON S.A.
Rejestracja	Lek
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.

Działanie

Przeciwkaszlowe.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.
- Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.
- Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.
- Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g, Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia tosta 3CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM 0,95g w 100 g syropu.

Pozostałe składniki to: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Stodal syrop, a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Stodal syrop zawiera etanol (alkohol) i sacharozę. Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu. 5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu i 3,75 g sacharozy. 15 ml syropu zawiera 0,206 g etanolu i 11,25 g sacharozy. Przeciwwskazany u osób z chorobą alkoholową. Ze względu na zawartość etanolu przed zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka (takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką) należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą. W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Dawkowanie u dzieci w wieku do 6 lat ustala lekarz.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.