


## Stoperan Elektrolity, smak pomarańczowy, 7 saszetek



Cena: 11,08 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	7 saszetek
Postać	proszek
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 3 roku życia

### Opis produktu

#### Opis

Stoperan Elektrolity, smak pomarańczowy, przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Specjalna kombinacja elektrolitów i glukozy, o optymalnych proporcjach i zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l. Dzięki zawartości potasu produkt wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego.

#### Zastosowanie

Biegunka i stany odwodnienia u dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych.

#### Zalecane spożycie

Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać.

#### Skład

1 saszetka: glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza, Osmolarność - 245 mOsm/l

#### Wartości odżywcze

	W 100 ml płynu
Wartość energetyczna	24 kJ
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0
Węglowodany	1

	W 100 ml płynu
- w tym cukry	1,7
Błonnik	0
Białko	0
Sól	260
Sód	170
Potas	79 mg (4)
Chlorki	229 mg (2)
Cytrynian	186
*RWS -realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia	

**Przechowywanie**

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
- Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność.
- Nie stosować przy: wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. W czasie przyjmowania produktu istotne jest prowadzenie oszczędzającego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej lekkostrawnej diety.