


Stoperan Elektrolity, smak truskawkowy, 7 saszetek



Cena: 11,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	7 saszetek
Postać	proszek
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis

Stoperan Elektrolity, smak truskawkowy, produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Specjalna kombinacja elektrolitów i glukozy o optymalnych proporcjach i zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l, zgodna z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dzięki zawartości potasu produkt wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w biegunce.

Zalecane spożycie

Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać.

Skład

1 saszetka: glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, Osmolarność - 245 mOsm/l

Warto?ci od?ywcze

Wartość energetyczna

Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

- w tym cukry

Błonnik

Białko

Sól

Sód

Potas

Chlorki

Cytrynian

RWS - % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia*Przechowywanie**

- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed wilgocią i światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność.
- Nie stosować przy: wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Dodatkowe informacje

- Zawiera cukier i substancje słodzące.
- W czasie przyjmowania produktu istotne jest prowadzenie oszczędzającego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej lekkostrawnej diety.