

Strepsils bez cukru truskawkowy, 16 pastylek twardych

Cena: 16,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	1,2 mg + 0,6 mg
Opakowanie	16 pastylek twardych
Postać	pastylki twarde
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Amylmetacresolum, Alkohol 2,4-dichlorobenzylol

Opis produktu

Wskazania

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

- Przeciwwirusowe,
- Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

- Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.
- Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylolowy i amyloetakrezol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylolowego i 0,6 mg amyloetakrezolu.

Pozostałe składniki to: esencja truskawkowa, antocyjanina (E 163), sacharyna sodowa (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób kontrolujących dzienne spożycie cukrów/węglowodanów.

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23 kJ.

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.