

Strepsils Intensive, 16 tabletek do ssania

Cena: 25,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg
Opakowanie	16 tabletek do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

W krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła u młodzieży powyżej 12. roku życia i osób dorosłych.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletkę należy ssać powoli. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by

uniknąć miejscowego podrażnienia.

- Nie stosować więcej niż 5 tabletek w ciągu doby.
- Działanie leku rozpoczyna się już po 30 minutach.

Skład

1 tabletkę zawiera:

substancję czynną: flurbiprofen

substancje pomocnicze: makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy, miód.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek

- substancję pomocniczą preparatu,
- Nie stosować u osób u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregośkolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypka,
 - Istniejąca lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkie zapalenie jelita grubego,
 - Zaburzenia krzepnięcia krwi,
 - Nie stosować przez osoby przyjmujące jednocześnie inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitory cyklooksygenazy 2, takie jak celekoksyb),
 - III trymestr ciąży,
 - Ciężka niewydolność serca.
 - Pacjenci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Reakcje nadwrażliwości:

Niezbyt często: reakcja skórna (w tym pokrzywka lub świąd).

Rzadko: astma, niespodziewane trudności w oddychaniu (sapanie) lub duszność, obrzęk twarzy, warg lub języka.

Bardzo rzadko: omdlenie.

- Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, nudności, biegunka.

Niezbyt często: niestrawność, wymioty, wzdęcia.

- Zaburzenia w obrębie jamy ustnej:

Bardzo często: uczucie gorąca/palenia w ustach.

Często: mrowienia w ustach, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej.

- Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Rzadko: uczucie senności lub bezsenność.

- Zaburzenia serca:

W związku z leczeniem NLPZ w dużych dawkach mogą wystąpić obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.

Przyjmowanie takich leków jak flurbiprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

- Podczas stosowania flurbiprofenu w większej dawce lub przez okres dłuższy niż zalecany zgłaszano następujące działania niepożądane: ciężkie reakcje alergiczne i reakcje skórne, krwawienie z żołądka, choroba wrzodowa żołądka, stan zapalny i owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczką (żółte zabarwienie skóry), zaburzenia czynności nerek (zmiany w moczu, ból pleców i obrzęk), niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu, zaburzenia krwi (które mogą powodować wystąpienie siniaków, gorączki, bólu gardła, owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej, błądź i osłabienie).

Bardzo często: >1/10

Często: > 1/100, <1/10

Niezbyt często: > 1/1000, < 1/100

Rzadko: > 1/10 000, < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek w następujących przypadkach: jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby, u pacjentów z niewydolnością serca, po przebytych udarach mózgu lub zwiększonym ryzykiem takich zaburzeń jak podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca lub zwiększone stężenie cholesterolu we krwi lub u osób palących tytoń, jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze.
- Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
- Lek zawiera sacharozę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.
- Lek ten należy do grupy leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przyjmować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.