

Strepsils Intensive Direct 8,75 mg, aerozol, 15 ml



Cena: 29,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol do stosowanie w jamie ustnej
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk osób dorosłych.

Działanie

Przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dorośli w wieku 18 lat i powyżej: Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin.
- Rozpylić aerozol jedynie na tylną ścianę gardła. Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek (15 rozpyleń aerozolu) w ciągu 24 godzin.
- Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni, o ile nie jest to zalecane przez lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu, co odpowiada 16,2 mg/ml flurbiprofenu.

Pozostałe składniki: Betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek, aromat miętowy, aromat wiśniowy, N,2,3-trimetylo-2-izopropylbutanoamid, sacharyna sodowa, hydroksypropylbetadeks, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na flurbiprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze składników;
- Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwasu acetylosalicylowego, np.

astma, świszczący oddech, swędzenie, nieżyt nosa, wysypka skórna, obrzęk;

- Jeśli pacjent ma lub miał dwa lub więcej epizody wrzodów żołądka lub krwawienia lub owrzodzenia jelit;
- Jeśli pacjent kiedykolwiek miał ciężkie zapalenie okrężnicy (zapalenie jelita grubego);
- Jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia krzepnięcia lub problemy z krwawieniem po przyjęciu NLPZ;
- Ostatni trymestr ciąży;
- Ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby.

Działania niepożądane

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy: objawy reakcji alergicznych, np. astma, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, świąd, nieżyt nosa lub wysypka skórna; obrzęk twarzy, języka lub gardła, powodujący trudności w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu (mogą wystąpić nawet przy pierwszym użyciu leku). Objawy nadwrażliwości i reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, obrzęk, łuszczenie, powstawanie pęcherzy lub owrzodzenie skóry i błon śluzowych.

- Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): zawroty głowy, ból głowy; podrażnienie gardła; owrzodzenie jamy ustnej, ból i drętwienie w jamie ustnej; ból gardła; dyskomfort (uczucie ciepła, pieczenia lub mrowienia) w jamie ustnej; nudności i biegunka; mrowienie i świąd skóry
- Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): senność; pęcherze w jamie ustnej lub w gardle, uczucie drętwienia gardła; wzdęcia brzucha, ból brzucha, wiatry, zaparcia, niestrawność, wymioty; suchość w jamie ustnej; uczucie palenia w ustach, zaburzenia smaku; wysypki skórne, świąd skóry; gorączka, ból, senność lub trudności w zasypianiu; zaostrzenie astmy, świszczący oddech, duszność; zmniejszenie czucia w gardle
- Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): reakcja anafilaktyczna.
- Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych): niedokrwistość, trombocytopenia (mała liczba płytek krwi, co może powodować powstawanie siniaków i krwawienia); obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca lub atak serca; ciężkie postaci reakcji skórnych, np. reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka (rzadkie schorzenia wskutek ciężkich działań niepożądanych leków lub zakażeń, w których następuje ciężka reakcja skóry i błon śluzowych); zapalenie wątroby.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.