

Strepsils pomarańczowy z witaminą C, 24 pastylki twarde

Cena: 22,49 zł



Opis słownikowy

Dawka	1,2 mg + 0,6 mg
Opakowanie	24 pastylki twarde
Postać	pastylki twarde
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Amylmetacresolum, Alkohol 2,4-dichlorobenzyllicus

Opis produktu

Wskazania

W objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Dawkowanie

- Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.
- Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, sodu askorbinian, lewomentol, esencja pomarańczowa, kwas winowy, glikol propylenowy, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), sacharoza i glukoza.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje: cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów), nietolerancja niektórych cukrów.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Żółcień pomarańczowa (E110) i czerwień koszenilowa (E124) może powodować reakcje alergiczne.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.