

Stymen 10 mg (DHEA), 60 tabletek



Cena: 42,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 10 mg |
| Opakowanie | 60 tabletek |
| Postać | tabletki |
| Producent | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Prasteronum |

Opis produktu

Opis

Stymen, lek w postaci tabletek, przeznaczony dla mężczyzn. Zawiera substancję czynną prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), która należy do grupy hormonów steroidowych. Jego ilość w organizmie zmniejsza się w trakcie starzenia. Najwyższe stężenie DHEA występuje u mężczyzn między 20. a 30. rokiem życia, a po 30. roku zmniejsza się ono stopniowo.

Wskazania

Leczenie niedoboru dehydroepiandrosteronu (DHEA) u mężczyzn z potwierdzonym laboratoryjnie niedoborem DHEA.

Działanie

- Podawanie DHEA może korzystnie wpływać m.in. na erekcję, popęd płciowy, samopoczucie, odporność organizmu i układ kostno-mięśniowy.
- Wspomagające działanie DHEA wykazano w następujących przypadkach: andropauza u mężczyzn; zmniejszenie sprawności fizycznej i psychicznej, szczególnie u osób w podeszłym wieku; pogorszenie nastroju, stany depresyjne, zaburzenia snu, spadek napędu; zaburzenia erekcji i spadek aktywności płciowej; otyłość; zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę; zaburzenia układu krążenia; zmniejszenie odporności immunologicznej; pierwotna i wtórna niewydolność kory nadnerczy.

Dawkowanie

- Dawka początkowa: 1 tabletkę raz na dobę. Lek należy przyjmować rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania hormonu DHEA. Dawkę początkową należy stopniowo zwiększać (co 2 tygodnie o 1 tabletkę na dobę) do czasu uzyskania pożądanego efektów leczniczych. Maksymalnie można przyjąć 5 tabletek (50 mg) na dobę.
- Lek stosować doustnie w czasie posiłku w celu ułatwienia wchłaniania.

Skład

- Substancją czynną leku jest prasteron.

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg prasteronu.

- Pozostałe składniki to: ludipress (laktoza jednowodna, powidon, krospowidon), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na DHEA lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Ciężkie uszkodzenie wątroby i (lub) nerek;
- Przerost gruczołu krokowego i (lub) nowotwór gruczołu krokowego;
- Rak sutka lub inne nowotwory;
- Dzieci.

Działania niepożądane

- Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): trądzik; nadmierne owłosienie; zmiany łojotokowe w skórze; łysienie kątowe typu męskiego; powiększenie gruczołu krokowego; niskie brzmienie głosu; nudności, wymioty, zwiększenie apetytu; obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody i soli w organizmie; hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi).
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): zapalenie wątroby; powiększenie wątroby (hepatomegalia); mania (zaburzenia psychiczne charakteryzujące się podwyższonym lub drażliwym nastrojem).

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Rozpoczęcie przyjmowania leku Stymen należy omówić z lekarzem, który zleci wykonanie koniecznych badań i na ich podstawie zdecyduje o konieczności stosowania tego leku.
- Pacjenci w wieku poniżej 40 lat nie powinni stosować tego leku.
- Bez porozumienia z lekarzem pacjent nie powinien zmieniać a w szczególności zwiększać dawki leku.
- Leczenie dolegliwości związanych z andropauzą występujących u ludzi starszych należy podejmować po wnikliwej analizie wraz z lekarzem korzyści i możliwych zagrożeń związanych ze stosowaniem leku.
- W przypadku długotrwałego stosowania leku w dawkach większych niż 5 tabletek (50 mg) na dobę, należy oznaczać stężenie hormonu DHEA we krwi i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.
- Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania; skutki działania widoczne są po kilku tygodniach stosowania.
- Lek nie powinien być stosowany u sportowców, gdyż należy do grupy niedozwolonych środków anabolicznych – androgennych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

- leki przeciwzakrzepowe (stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, jak np. heparyna, warfaryna);
- leki zawierające androgeny (męskie hormony płciowe) jak testosteron i pochodne testosteronu, ponieważ może wystąpić nasilenie działań androgennych;
- leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu padaczki, np. karbamazepina, kwas walproinowy);
- leki psycholeptyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. pochodne fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny), ponieważ Stymen może osłabiać ich działanie.

- Lek należy przyjmować w czasie posiłku, w celu ułatwienia wchłaniania.
- Nie wolno go stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
- Lek zawiera laktozę: jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.