

Succus Betulae 2,33 g/ 2,5 ml, płyn doustny, 100 ml



Cena: 13,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Betulae fol.succus
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Lek wspomagający w łagodnych dolegliwościach dróg moczowych, zwiększający ilość wydalanego moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych.

Działanie

Łagodzenie dolegliwości dróg moczowych.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: do 3 razy dziennie po 2,5 ml preparatu w niewielkiej ilości płynu.
- W trakcie leczenia wymagane jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, w celu zwiększenia ilości wydalanego moczu.
- Lek można stosować 2-4 tygodnie. Jeśli w trakcie stosowania produktu objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie

stosować samodzielnie przez dłuższy okres czasu.

Skład

Substancją czynną leku jest Betulae folii recentis succus – sok ze świeżych liści brzozy (1:1), stabilizowany etanolem. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda. Zawartość etanolu w preparacie 50-60% (V/V).

Przeciwwskazania

- Alergia na pyłki brzozy lub substancję czynną (sok z brzozy),
- W przypadku, gdy zalecane jest ograniczenie przyjmowania płynów (np. w niektórych chorobach serca lub nerek)

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), reakcje alergiczne (świąd, wysypka,

pokrzywka, katar sienny) - częstość występowania powyższych reakcji nie jest znana.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować szczególną ostrożność stosując lek, gdyż dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera 1,1 g etanolu, co odpowiada ok. 12 ml wina i 28 ml piwa. Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania leku przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych. Jeżeli w czasie stosowania produktu, objawy nie ustępują lub pojawiają się działania niepożądane, takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle skurczowe lub krew w moczu oraz inne niewymienione w ulotce, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
- Osoby z chorobami serca lub nerek powinny zasięgnąć opinii lekarza przed przyjęciem leku.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.