

SuccusUrticae Phytopharm, 2,425g/2,5ml, płyn doustny, 100 ml



Cena: 14,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Urticae herba succus
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych w celu zwiększenia ilości wydalanego moczu i poprawienia przepływu w drogach moczowych oraz pomocniczo w łagodnych dolegliwościach reumatycznych.

Działanie

Moczopędne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 12 lat: 3 razy dziennie po 2,5-5 ml, leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Lek odmierzać za pomocą dołączonej miarki.

Nie stosować dłużej niż 14 do 28 dni.

Skład

Substancją czynną produktu leczniczego jest sok ze świeżego ziele pokrzywy stabilizowany etanolem – Urticae herbae succus (1:1) – 100 ml.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny – etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-25% (V/V).

Przeciwwskazania

- Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na ziele pokrzywy.
- Nie stosować w przypadku, gdy zalecane jest ograniczenie spożycia płynów (np. w poważnych chorobach serca lub nerek).
- Ze względu na zawartość etanolu oraz braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie należy stosować leku u dzieci

poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, pokrzywka). Częstotliwość występowania tych objawów nie jest znana.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
- Nie zaleca się przyjmowania leku łącznie z lekami syntetycznymi o działaniu moczopędnym.
- Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.