

# Sylicynar, 60 tabletek powlekanych

Cena: 27,90 zł



## Opis słownikowy

Dawka	140 mg + 28,6 mg
Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Silibi mariani extractum siccum, Cynarae herba extractum
Wiek	od 12 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

- W stanach po toksycznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin).
- Wspomagająco znajduje zastosowanie w zaburzeniach czynności wątroby oraz przy podwyższonym stężeniu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi przy zachowaniu diety niskotłuszczowej.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Produkt wymaga systematycznego stosowania. Okres terapii należy konsultować z lekarzem.

### Skład

Substancjami czynnymi są:

- 140 mg wyciągu suchego z zieleń karczochu (Cynarae herbae extractum, DER 3 - 7 : 1, ekstrahent: woda),
- 28,6 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu (Silibi mariani fructus extractum, DER 20 - 34 : 1, ekstrahent: metanol 90%),

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi, powidon, talk, stearynian magnezu,

składniki otoczek: hypromeloza, makrogol 6000, czerń brylantowa E151, żółcień chinolinowa E104, czerwień koszenilowa E124.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae).

### Działania niepożądane

- W trakcie stosowania istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz łagodnego działania przeczyszczającego.
- Reakcja alergiczna może być też spowodowana obecnością innych składników produktu, takich jak np. czerń brylantowa.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przeciwwskazaniem do stosowania tego leku jest niedrożność dróg żółciowych.
- W przypadku kamicy żółciowej należy przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Podczas terapii i po jej zakończeniu należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.
- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i kobiet w okresie laktacji. Lek może być stosowany po uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Sylicynar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ten lek zawiera czerń brylantową. Lek może powodować reakcje alergiczne.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.