

Sylimarol 70 mg, 30 tabletek drażowanych



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,07 g
Opakowanie	30 tabletek drażowanych
Postać	tabletki drażowane
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Silibi mariani extractum siccum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w:

- stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.
- dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Działanie

Wspomagające w zaburzeniach czynności oraz po uszkodzeniach wątroby. Zawiera wyciąg z łuski ostropestu plamistego.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie 1 tabletkę po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2-4 tygodnie.
- Jeśli dolegliwości nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Skład

Substancjami czynnymi leku są:

100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, DER 20-34:1, ekstrahent – metanol 90%)

Substancja pomocnicza dodana do wyciągu: benzoesan sodu

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: glukozę, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, talk, magnezu stearynian, gumę arabską, mieszaninę wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny Compositae/Asteraceae.

Działania niepożądane

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych zatruc wątroby.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.
- Nie należy stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.
- W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.
- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 12 roku życia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.