

Syrop tymiankowy złożony Hasco, 125 g

Cena: 9,99 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	płyn
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Thymi sirupus compositus
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Kaszel z trudnością w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny.

Działanie

Wykrztuśny.

Dawkowanie

- Podanie doustne.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Skład

100 g syropu sporządzonego wg receptury FPVI zawiera:

Substancje czynne:

Wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum) 15,0 g

Tymol (Thymolum) 0,01 g

Substancje pomocnicze:

Amonowy wodorotlenek 10 %

Etanol 96 %

Syrop prosty

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik syropu.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania syropu lub jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna płwocina należy skonsultować się z lekarzem.
- Jednorazowa dawka syropu dla dorosłych (10 ml) zawiera 7,2 g sacharozy.
- Jednorazowa dawka syropu dla dzieci (5 ml) zawiera 3,6 g sacharozy.
- Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Syrop zawiera 7,9% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 0,6 g etanolu na dawkę, co jest równoważne 15,8 ml piwa i 6,6 ml wina na maksymalną dawkę jednorazową. Zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Lek może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
- Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci od 6 lat bez konsultacji z lekarzem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.