

Tabex 1,5 mg, na uzależnienie od nikotyny, 100 tabletek powlekanych



Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg
Opakowanie	100 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cytisinum

Opis produktu

Wskazania

Stosowany w celu stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Działanie

Cytyzyna jest alkaloidem, który oddziałuje na receptory nikotynowe. Cytyzyna konkuruje z nikotyną o te same receptory, wiąże się silniej, stopniowo wypiera z nich nikotynę. Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji.

Dawkowanie

- Lek do stosowania doustnego. Przyjmować z odpowiednią ilością wody.
- Czas leczenia wynosi 25 dni.
- Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.
- Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
- Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.
- od 1 do 3 dnia: 1 tabletko co 2h, maksymalna dawka dzienna: 6
- od 4 do 12 dnia: 1 tabletko co 2,5h, maksymalna dawka dzienna: 5
- od 13 do 16 dnia: 1 tabletko co 3h, maksymalna dawka dzienna: 4
- od 17 do 20 dnia: 1 tabletko co 5h, maksymalna dawka dzienna: 3
- od 21 do 25 dnia: 1-2 tabletki dziennie, maksymalna dawka dzienna: do 2 tabletek.

Skład

Substancją czynną jest: cytyzyna (Cytisinum).

1 tabletkę zawiera 1,5 mg cytyzyny.

Substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu; skład otoczki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek, polietylenoglikol 3000, tracetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cytyzynę lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku,
- W przypadku niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu,
- Okres ciąży i karmienia piersią,
- Osoby poniżej 18 lat.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera laktozę.
- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnica, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.
- Nie zaleca się stosowania leku u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
- Lek należy przyjmować wyłącznie przez osoby, które noszą się z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu.
- Jednoczesne przyjmowanie leku i palenie tytoniu może prowadzić do nasilenia się działań niepożądanych.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarzach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
- Lek może wchodzić w interakcje z lekami przeciwgruźliczymi.
- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.