

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 20 tabletek



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Działanie

Łagodzi dolegliwości związane z zaburzeniami procesu trawienia.

Dawkowanie

- Przyjmować doustnie.
- Dorośli, osoby w wieku podeszłym i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy dziennie, tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Skład

Korzeń mniszka lekarskiego 100 mg, owoc kminku 50 mg, liść mięty pieprzowej 60 mg, kora kruszyny 60 mg, wyciąg suchy oczyszczony i standaryzowany z owoców ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: aceton 95%) (Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum) 7 mg.

1 tabletkę zawiera 3,8 mg związków antranoïdowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoïdowe, korzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae), a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- Niedrożności, zwężenia lub atonii (zastoju) jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, schorzeń zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bólów brzucha o nieustalonej etiologii, stanu odwodnienia połączonego z utratą elektrolitów niedrożności lub zwężenia dróg żółciowych, chorób wątroby, kamicy żółciowej, czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, innych chorób dróg żółciowych.

Przechowywanie

- W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Nie jest zalecane stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.