

Tabletki tonizujące, 20 tabletek



Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Lek wspomagający pracę serca i układu krążenia (w przypadku braku obrzęków, zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne).

Działanie

Wspomaga pracę serca i układu krążenia.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: 2 tabletki od 2 do 3 razy dziennie, przed jedzeniem.
- Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować przez dłuższy okres czasu.

Skład

Crataegi folium cum flore - 150 mg, Crataegi fructus - 30 mg, Leonuri cardiaca herba - 100 mg, Meliloti herba - 40 mg

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jedna tabletkę zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- Nie stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.

Działania niepożądane

Możliwe jest wystąpienie dolegliwości żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych.

Przechowywanie

- W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
- Możliwość przyjmowania z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy skonsultować z lekarzem. W przypadku pojawienia się bólu w okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy brzusznej lub w okolicy szyi, obrzęków (zwłaszcza w

obrębie kończyn dolnych), duszności, zapalenia skóry, zapalenia zakrzepowego żył, podskórnych stwardnień, wrzodów skórnych, ostrego bólu związanego z dolegliwościami skórnymi, niewydolności serca lub nerek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się w trakcie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

- Produkt może wywoływać interakcje z lekami przeciwkrzepliwymi.
- Nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.