

Tabletki tonizujące Labofarm, 60 tabletek



Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt ziołowy
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Lek wspomagający pracę serca i układu krążenia (w przypadku braku obrzęków, zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne).

Działanie

Wspomagające pracę serca i układu krążenia.

Dawkowanie

- Doustnie. Dorośli: 2 tabletki 2-3 razy dziennie przed jedzeniem.
- Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

Skład

Skład tabletki: kwiatostan głogu - 150 mg, owoc głogu - 30 mg, ziele serdecznika - 100 mg, ziele nostryka - 40 mg.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jedna tabletki zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.

Działania niepożądane

Możliwe jest wystąpienie dolegliwości żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych.

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować ostrożność przy stosowaniu leku: możliwość przyjmowania z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy skonsultować z lekarzem. W przypadku bólu w okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy brzusznej, w okolicy szyi, obrzęków (zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych) oraz wystąpienia duszności, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem.

- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
- Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.