

Tadalafil Maxon 10 mg, 2 tabletki powlekane



Cena: 30,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Opakowanie	2 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Tadalafilum

Opis produktu

Opis

Tadalafil Maxon jest lekiem dla mężczyzn z problemami zaburzenia erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji pręża w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcji ze stosunku płciowego. Wykazano, że tadalafil znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu (erekcji) odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Tadalafil Maxon nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Warunkiem skuteczności leku Tadalafil Maxon jest stymulacja seksualna.

Wskazania

Lek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

Działanie

Tadalafil Maxon zawiera substancję czynną tadalafil w dawce 10 mg, który należy do grupy leków zwanych „inhibitorami fosfodiesterazy typu 5” (PDE5). Po stymulacji seksualnej Tadalafil Maxon wspomaga rozszerzenie naczyń krwionośnych członka umożliwiając napływ krwi i doprowadzając do erekcji. Pacjent i jego partnerka powinni pamiętać o pobudzeniu seksualnym, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Dawkowanie

- Jedna tabletki 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną, można przyjąć przynajmniej 30 minut przed aktywnością.
- Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Skład

Substancją czynną leku jest 10 mg tadalafilu.

Pozostałe składniki to rdzeń tabletki: laktoza jednowodna (patrz koniec punktu 2), celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172)

Przeciwwskazania

- Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji.
- Nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem sylденаfilu ani innymi inhibitorami PDE5.
- Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Maxon nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego.
- Nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek Tadalafil Maxon może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Dodatkowe informacje

- Lek Tadalafil Maxon zawiera laktozę
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.