

Tanakan 40 mg, 90 tabletek powlekanych



Cena: 88,34 zł

Opis słownikowy

Dawka	40 mg
Opakowanie	90 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BEAUFOR IPSEN PHARMA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ginkgo bilobae extractum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Lek stosowany w celu poprawy upośledzonych funkcji poznawczych u osób starszych oraz poprawy jakości życia pacjentów z łagodną postacią otępienia.

Działanie

Poprawa upośledzonych funkcji poznawczych u osób starszych oraz poprawa jakości życia pacjentów z łagodną postacią otępienia.

Dawkowanie

- Dorośli: Zalecana dawka to trzy tabletki na dobę rozłożone równomiernie w ciągu dnia.
- Stosować doustnie. Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłków, popijając je ½ szklanki wody.

Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo folii extractum siccum)

Każda tabletkę zawiera 40 mg suchego wyciągu z miłorzębu, oczyszczonego i kwantyfikowanego (EGb761) z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu japońskiego) (35-67:1) co odpowiada:

- 8,8 do 10 mg flawonoidów wyrażonych jako glikozydy flawonowe
- 1,1 do 1,4 mg ginkgolidów A, B oraz C
- 1,0 do 1,3 mg bilobalidu.

Pierwszy ekstrahent: aceton 60 % (m/m)

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu

stearynian.

Mieszanka powlekająca: hypromeloza, macrogol 400 (glikol polioksyetylenowy), macrogol 6000 (glikol polioksyetylenowy), tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony.

Przeciwwskazania

Uczulenie na wyciąg z liści miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi są: ból brzucha, biegunka i zawroty głowy.
- Jeśli u pacjenta wystąpi poważna reakcja nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy) powodująca opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, należy przerwać stosowanie leku i pilnie zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską.
- Częste działania niepożądane: (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób): reakcje nadwrażliwości, trudności w oddychaniu, ból głowy, omdlenia, niestrawność, złe samopoczucie, egzema (wyprysk na skórze), świąd.
- Niezbyt częste (występują u nie więcej niż 1 na 100 osób): pokrzywka, wysypka.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.
- Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy po przyjęciu leku Tanakan. Jeśli tak się stanie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
- Ponieważ lek zawiera laktozę, jest przeciwwskazany u osób z wrodzoną galaktozemią, z zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, bądź też z niedoborem laktazy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.