

Taninal 500 mg, 20 tabletek



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tanninum albuminatum
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Lek stosuje się tradycyjnie w biegunkach i zatruciach pokarmowych.

Działanie

Lek zawiera połączenie garbników - kwasu taninowego (taniny) z białkiem - albuminą. Dzięki takiemu połączeniu lek nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w jelicie cienkim pod wpływem działania enzymu trawiennego pankreatyny. Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne, działa także przeciwbiegunkowo, tworząc trudno rozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi. Ponadto hamuje drobne krwawienia przy uszkodzeniach naczyń włosowatych śluzówki jelit.

Dawkowanie

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek stosować doustnie, tabletkę po zażyciu popić wodą. Przyjmować między posiłkami, do czasu ustąpienia objawów.
- Dorośli - 3 razy na dobę 1 do 2 tabletek.
- Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat - 2 do 3 razy na dobę 1 do 1 tabletki.
- Dzieci poniżej 4 lat - nie należy stosować.

Skład

- Substancją czynną leku jest Tanninum albuminatum (białczan taniny) – 500 mg na tabletkę.
- Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, sól sodowa karboksymetyloskrobi, powidon, talk.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną (białczan taniny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty) – rzadko (od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ostrzeżenia i środki ostrożności: jeżeli mimo zastosowanego leczenia biegunka nasila się lub nie ustępuje przez okres dłuższy niż 2-3 dni u dorosłych i młodzieży lub ponad 1 dzień u dzieci, należy zgłosić się do lekarza.
- Lek Taninal a inne leki: tego leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami. Pomiedzy przyjęciem tego leku i innych leków powinny upłynąć co najmniej 2 godziny, ponieważ lek Taninal może hamować wchłanianie innych leków.
- Stosowanie leku Taninal z jedzeniem, pićm i alkoholem: lek ten należy przyjmować między posiłkami. W trakcie leczenia należy przyjmować dużo płynów.
- Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność: nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed użyciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na płodność nie jest znany. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.