

Tantum Rosa, 1 mg/ml, roztwór dopochwowy, 140 ml, 5 butelek



Cena: 36,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	5 butelek x 140 ml
Postać	roztwór dopochwowy
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Wskazania

Leczenie dolegliwości i objawów typu: ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy, towarzyszących: zapaleniu sromu i pochwy, zapaleniu szyjki macicy różnego pochodzenia, także po chemio- i radioterapii, profilaktyce przed i pooperacyjnej w ginekologii.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające, odkażające.

Dawkowanie

- Lek przeznaczony jest do płukania pochwy. Każda butelka jest jednorazowego użytku.
- Zalecany sposób dawkowania: od 1 do 2 płukań w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości;
- Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolice krocza i sromu) współistniejącego z zapaleniem pochwy i (lub) szyjki macicy: od 1 do 2 płukań na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Profilaktyka przed i pooperacyjna w ginekologii: według wskazań lekarza.
- W przypadku samodzielnego rozpoczęcia leczenia lekiem można stosować nieprzerwanie nie dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz. Celem uzyskania poprawy, leczenie nie powinno trwać krócej niż 3 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest benzydaminii chlorowodorek (Benzydaminii hydrochloridum).
- 100 ml roztworu zawiera 100 mg benzydaminii chlorowodoru.
- Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek roztwór, disodu edetynian, etanol 96%, polisorbata 20, olejek różany, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Działania niepożądane o nieznanym częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia w miejscu zastosowania leku, wysypka fotoalergiczna, pokrzywka.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.