

Tantum Rosa, proszek do sporządzania roztworu dopochwowego, 10 saszetek



Cena: 26,91 zł

Opis słownikowy

Dawka	53,2 mg/g
Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek do leczenia objawów zapalnych narządów płciowych
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Wskazania

- Leczenie dolegliwości i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy.
- W profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu w okresie połogu.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz miejscowo znieczulające i odkażające. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym.

Dawkowanie

- Lek stosuje się dopochwowo, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 1/2 litra przegotowanej, ostudzonej wody. Roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Jeśli pacjentka samodzielnie rozpoczęła leczenie to powinno ono trwać od 3 do 7 dni. Dłuższe stosowanie leku wymaga konsultacji z lekarzem. Do aplikacji leku należy stosować irygator do higieny intymnej.
- Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolice krocza i sromu) współistniejącego z zapaleniem pochwy i (lub) szyjki macicy: płukać pochwę roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej,
- Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolice krocza i sromu) oraz w połogowych dolegliwościach okolicy krocza: przemywać okolice krocza i sromu roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę,
- Profilaktyka przed- oraz pooperacyjna w ginekologii: według wskazań lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek (Benzydaminę hydrochloridum).
1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminę chlorowodoru.
Substancje pomocnicze: sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): uczucie pieczenia błony śluzowej pochwy, wysypka fotoalergiczna, pokrzywka.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.