

Tantum Verde 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 30 ml



Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Cena jednostkowa | 30 ml |
| Dawka | 1,5 mg/ml |
| Opakowanie | 30 ml |
| Postać | aerozol do stosowania w jamie ustnej |
| Producent | AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Benzydaminum |

Opis produktu

Opis

Lek Tantum Verde, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, zawiera substancję czynną benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego.

Wskazania

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające i odkażające.

Dawkowanie

- Lek należy rozpylać na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
- Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku (rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
- Dorośli: od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu

powinien zdecydować lekarz.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek.

100 ml roztworu zawiera 0,15 g benzydaminę chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka.
- Miejscowe objawy są związane z działaniem farmakodynamicznym benzydaminę, która między innymi wykazuje działanie miejscowo znieczulające.
- Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.
- Benzydaminę stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.