

Tantum Verde 3 mg, smak miodowo-pomarańczowy, 30 pastylek twardych



Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	30 pastylek twardych
Postać	pastylki twarde
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Wskazania

Dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Działanie

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

Dawkowanie

Ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Skład

- Substancją czynną leku Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy jest benzydaminu chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: izomalt, kwas cytrynowy jednowodny, substancję smakową pomarańczową, substancję smakową miodową, lewomentol, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową (E 110).

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie.
- Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagły obrzęk jamy ustnej lub gardła, trudności w oddychaniu, wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na

światło.

- Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.
- Działania niepożądane o nie znanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne (są to uogólnione reakcje alergiczne o natychmiastowym i gwałtownym przebiegu), niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25 C, w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na postać farmaceutyczną leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku 6 do 12 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.