

# Terbinafina Ziaja 10 mg/ g, krem, 15 g



Cena: 10,55 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10 mg/ g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Terbinafinum
Wiek	od 12 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Terbinafina Ziaja, lek w postaci kremu zawierający substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek działa grzybobójczo (powoduje śmierć grzybów) na grzyby wywołujące zakażenia skóry u ludzi, jak dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

### Wskazania

Grzybica stóp, łupież pstry, grzybica podeszwowa stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej, drożdżycza skóry.

### Działanie

Przeciwgrzybicze.

### Dawkowanie

- Do stosowania na skórę.

### Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- Grzybica stóp: raz na dobę przez 1 tydzień;
- Grzybica podeszwowa stóp: 2 razy na dobę przez 2 tygodnie;
- Grzybica fałdów skórnych: raz na dobę przez 1 tydzień;
- Grzybica skóry gładkiej: raz na dobę przez 1 tydzień;
- Drożdżycza skóry: raz na dobę przez 1 tydzień;
- Łupież pstry: raz na dobę przez 2 tygodnie.

### Skład

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek. Jeden gram kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodoru.

- Pozostałe składniki to: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitanu stearynian (Typ 50), cetylu palmitynian (15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

#### **Przeciwwskazania**

Uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### **Działania niepożądane**

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): występuje zaczerwienienie skóry, świąd, uczucie pieczenia lub kłucia w miejscach, gdzie zastosowano lek.

Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Nie należy jednak mylić ich z reakcjami alergicznymi (uczuleniowymi), takimi jak: świąd, wysypka, zapalenie pęcherzykowe i pokrzywka. Reakcje uczuleniowe pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

#### **Przechowywanie**

- W temperaturze poniżej 25 °C. Nie zamrażać.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- W okresie ciąży lek Terbinafina Ziąja można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.
- Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Nie zaleca się stosowania leku Terbinafina Ziąja u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.