

Tersilat 10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór, 30 ml

Cena: 7,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 mg/g
Opakowanie	30ml
Postać	aerozol na skórę, roztwór
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Terbinafinum

Opis produktu

Wskazania

W miejscowym leczeniu: grzybicy stóp, grzybicy skóry gładkiej, grzybicy fałdów skórnych, łupieżu pstrego.

Działanie

Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Dawkowanie

- Stosować na chorobowo zmienione miejsca.

Dorośli:

- grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień,
- grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień,
- grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień,
- łupież pstry - dwa razy na dobę przez 1 tydzień.

Skład

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek. 1 g leku zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku. Pozostałe składniki to: etanol, glikol propylenowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach pokrytych roztworem. Objawy te rzadko

wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami, a także uszkodzoną skórą.
- Nie należy stosować u dzieci.
- Nie należy wdychać leku.
- Nie stosować innych leków czy innych sposobów leczenia na zmienione chorobowo miejsca na skórze (w tym leków dostępnych bez recepty) podczas leczenia lekiem Tersilat.
- W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.
- Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią, gdyż terbinafina przenika do mleka ludzkiego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.