

Theraflu Max Grip 1000 mg + 70 mg + 10 mg, lek przeciw objawom grypy i przeziębienia, 10 saszetek



Cena: 27,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	1000 mg + 70 mg + 10 mg
Opakowanie	7,6 g x 10 saszetek
Postać	proszek do sporządzenia roztworu
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Acidum ascorbicum, Phenylephrini hydrochloridum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Theraflu Max Grip, lek przeciw objawom grypy i przeziębienia, do krótkotrwałego stosowania. Przeznaczony dla dzieci od 12. roku życia i dorosłych. Lek ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego, Lek ma smak owoców leśnych i mentolu.

Wskazania

Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia, do krótkotrwałego stosowania.

Działanie

- Udroźnia nos i zatoki, ułatwia oddychanie,
- Obniża gorączkę,
- Zmniejsza ból głowy i gardła.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie, 1 saszетка leku w razie konieczności co 4 do 6 godzin, do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.
- Wsypać zawartość saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dostłodzić.

Skład

1 saszетка zawiera jako substancje czynne 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodoru fenylefryny oraz substancje pomocnicze, w tym: 5 g sacharozy, 117 mg sodu, żółcień pomarańczową, karmozynę i aspartam.

Przeciwwskazania

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa).

Przechowywanie

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

- Lek może powodować zawroty głowy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.