

Theraflu Total Grip 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg |
| Opakowanie | 10 saszetek |
| Postać | proszek do sporządzania roztworu doustnego |
| Producent | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Paracetamol, Guaifenesinum, Phenylephrini hydrochloridum |

Opis produktu

Wskazania

Leczenie krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączkę, zablokowany nos i produktywny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny u osób dorosłych, starszych i młodzieży w wieku 16 lat i starszych o masie ciała 50 kg i większej.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, działa obkurczająco na błonę śluzową nosa i zatok, wykrztuśne.

Dawkowanie

- Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku 16 lat i starsza o masie ciała 50 kg i większej: 1 saszетка, co 4 do 6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetki na dobę. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni.
- Rozpuścić zawartość jednej saszetki w około 250 ml gorącej, ale nie wrzącej wody. Wymieszać w celu rozpuszczenia. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Skład

Jedna saszетка zawiera: 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg chlorowodoru fenylefryny, 200 mg gwajafenezyny oraz substancje pomocnicze: sacharozę, sól i aspartam (E951).

Substancje pomocnicze: Sacharoza, Cytrynian sodu, Kwas cytrynowy bezwodny, Kwas winowy, Aromat cytrynowy 87A069, Aromat cytrynowy 875060 (zawiera butylohydroksyanizol), Aromat mentolowy 876026, Acesulfam potasowy (E950), Aromat cytrynowy 501.476/AP05.04, Aspartam (E951), Aromat cytrynowy 875928, Żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 16 lat i młodzieży w wieku 16-18 lat ważących mniej niż 50 kg.
- Nie należy stosować leku równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
- Nie należy stosować równocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu kaszlu, przeziębienia lub kataru, a także z alkoholem.
- Nie należy stosować leku podczas ciąży lub karmienia piersią.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- W sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- stosowania innych leków,
- gdy pacjent znajduje się pod opieką medyczną.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.