

Tiorfan 100 mg, lek przeciwbiegunkowy, 10 kapsułek twardych



Cena: 47,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	10 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	BIOPROJET EUROPE LTD
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Racecadotrilum

Opis produktu

Wskazania

- Leczenie objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo.
- Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

Działanie

Przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

- Zwykle stosowana dawka: 1 kapsułka 3 razy dziennie, poćknąć popijając szklanką wody.
- Należy przyjmować najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można przyjąć jedną kapsułkę o dowolnej porze dnia.
- Lekarz zdecyduje o długości leczenia. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.
- W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów).

Skład

Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu.
Inne składniki leku to: laktoza, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są bóle głowy (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100).
- Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000): wysypka i rumień (zaczzerwienienie skóry).
- Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej), obrzęk języka, obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pod skórą występujący w różnych częściach ciała), pokrzywka, rumień guzowaty (podskórne stany zapalne w postaci guzków), wysypka grudkowa (wykwity na skórze z małymi, twardymi i guzkowatymi zmianami), świerzbączka (swędzące zmiany skórne), świąd (uogólnione swędzenie), toksyczny wykwit skóry.
- Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, przy podejrzeniu ciąży i w czasie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem leku Tiorfan zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.