

Tran Hasco 500 mg, 60 kapsułek



Cena: 21,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oleum Jecoris Aselli
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- W profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci (wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku).
- W zapobieganiu krzywicy.
- W zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia.
- W łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych.
- Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

Działanie

- Witamina A odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości.
- Witamina D (cholekalcyferol) reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową ustroju, odpowiadając za utrzymanie stanu równowagi pomiędzy wapniem i fosforem - głównymi składnikami budulcowymi kośćca.
- Nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA i DHA) obniżają zawartość trójglicerydów i LDL cholesterolu oraz zwiększają ilość HDL cholesterolu o działaniu ochronnym.

Wszystkie te czynniki obniżają ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.

Dawkowanie

- O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę.
- Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera olej wątluszowy (typ B) (Oleum Jecoris Aselli) 500 mg o zawartości:
Witamina A 300-1250 j.m.
Cholekalcyferol 30-125 j.m.
Kwas eikozapentaenowy (EPA) 35-80 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 30-90 mg
Substancje pomocnicze: skład otoczki żelatynowej: żelatyna, glicerol.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
- W przypadku hiperkalcemii i kamicy nerkowej.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą (nadwrażliwość na wit. D).
- Bez wskazań lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę.
- Duże dawki witaminy A mogą spowodować zaburzenia rozwojowe płodu. Podczas ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej

konieczności, po porozumieniu z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.